INDICAZIONI per i pazienti che devono sottoporsi ad FNAB eco-guidato in trattamento con Anticoagulanti orali o Anticoagulanti piastrinici

A) Paziente in trattamento con **ANTICOAGULANTI ORALI tradizionali** detti anche decumarolici **Coumadin** (warfarin) e **Sintrom** (acenocumarolo):

1. sospendere cinque giorni prima dell'FNAB-Ecoguidato fino a raggiungere valori di P.T.-INR fra 1.5 e 1.7 e riprendere il decumarolico il giorno seguente FNAB-Ecoguidato;
2. Sospendere cinque giorni prima dell'FNAB-Ecoguidato, iniziare eparina s.c. a basso peso molecolare (p.e. Enoxaparina (p.e. CLEXANE 4.000 UI 1 f.s.c./die), sospendere 12 ore prima dell'FNABEcoguidato, riprendere il decumarolico il giorno seguente FNAB-Ecoguidato mantenendo l'eparina fino al raggiungimento del range terapeutico (si valuta con INR).

B) Paziente in trattamento con **NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI (NAO)** (attualmente, marzo 2021, in Italia sono presenti sul mercato farmaceutico quattro nuovi anticoagulanti orali: rivaroxaban (**XARELTO**), apixaban (**ELIQUIS**), edoxaban (**LIXIANA**), dabigatran (**PRADAXA**):

Sarebbe utile valutare la clearance della creatinina:

1. > o uguale ad 80 ml/min	sospendere 24 ore prima
2. > o uguale a 50 e < ad 80 ml/min	sospendere 24/48 ore prima
3. > o uguale a 30 e < a 50 ml/min	sospendere 24/48 ore prima

Riprendere il giorno dopo.

C) Paziente in trattamento con **Acido Acetilsalicilico** (ASPIRINA, CARDIASPIRINA, CARDIRENE, VIVIN), FANS o altri (ticlopidina, clopidogrel, abciximab):
• sospendere cinque giorni prima dell'FNAB-Ecoguidato.