# PREPARAZIONE ALL'INTERVENTO DI BIOPSIA PROSTATICA

Gentile Paziente, per l'esecuzione della biopsia, il giorno dell'esame dovrà esibire i seguenti

**ESAMI:**

- Emocromo, azotemia, creatinina, got, gpt, ggt, glicemia, coagulazione (PT, PTT).
- Visita Cardiologica, Ecg, Ecocardiogramma

L'esito di tali esami deve essere preventivamente valutato dal proprio Medico Curante che prenderà visione delle indicazioni fornite dal presente documento.
Si prega di presentare i risultati degli esami almeno il giorno precedente l'intervento chirurgico, oppure inviarli via email all'indirizzo antonella@biocontrol.it

**PREPARAZIONE:**

1. Eseguire un CLISTERE DI PULIZIA (Es. clisma fleet) la sera prima della procedura.
2. Assumere I DOSE DI ANTIBIOTICO: Fosfomicina trometamolo 3g, 1 bustina, 3 ore prima della biopsia (o altro antibiotico consigliato dal Curante se sussistono controindicazioni cliniche/allergie all'assunzione di fosfomicina).

PORTARE CON SÉ IL CD DELLA RISONANZA MAGNETICA MULTIPARAMETRICA DELLA PROSTATA.

**IN CASO DI ASSUNZIONE DI FARMACI ANTAGGREGANTI/ANTICOAGULANTI:**

E' necessario sospendere, salvo controindicazioni cardiologiche, eventuali terapie antiaggreganti 5-7 giorni prima dell'esame (es. cardioaspirina, cardirene, plavix).
Se assume terapia anticoagulante orale (coumadin-sintrom, pradaxa, xarelto, eliquis) CONTATTARE IL PROPRIO CARDIOLOGO/MEDICO CURANTE DI RIFERIMENTO per le indicazioni specifiche (sospensione ed eventuale sostituzione con EPARINE A BASSO PESO MOLECOLARE) la cui certificazione dovrà essere esibita il giorno dell'esame con dosaggio PT e PTT eseguito dopo la sospensione del farmaco, nei range di norma.

In questo modo è possibile ridurre in modo significativo complicanze come sanguinamenti o emorragie.

Osservare il digiuno completo per almeno 6 ore prima dell'intervento (l'acqua è consentita in piccolissima quantità solo per assumere farmaci importanti per il cuore o pressione).

***>>Presentarsi circa 30 minuti prima della procedura. Si consiglia inoltre la presenza di un accompagnatore***.

Al termine dell'esame, non abbandonare la struttura sino alla ripresa di minzioni spontanee valide. L'esecuzione dell'esame è strettamente vincolata a tutte queste indicazioni.

Entro 24 h dalla prima dose, assumere la II DOSE DI ANTIBIOTICO: fosfomicina trometamolo, 1 bustina (o antibiotico alternativo segnalato dal Curante in base ad eventuali allergie).