PREPARAZIONE ECOGRAFIA PEDIATRICA DELL'ADDOME

ADDOME SUPERIORE ED INFERIORE

- ***Bambini da 1-3 anni****:*
  -digiuno da 4-6 ore +
  -pulizia intestinale con peretta 2 ore prima dell'esame preparata con acqua appena appena tiepida (15 ml/Kg) + 2 microlax o similare +
  -mylicon gocce: 2 gtt/Kg ogni 8 ore da iniziare tre giorni prima dell'esame +
  -evitare fin dal giorno prima cibi con verdure e grassi.
  -vescica piena: bere ½ litro – 1 litro di acqua 45 minuti prima dell'esame.

  Bambini da 3-14 anni:
- -tre giorni prima dell'esame iniziare ad assumere 1-2 cpr di Mylicon ogni 8 ore oppure Mylicon gocce 3gtt/Kg/ogni 8 ore
  -evitare dalle 24 ore prima di assumere cibi con verdure e grassi
  -digiuno da 6 ore prima dell'esame
  -tre ore prima dell'esame pulizia intestinale mediante clistere

  VESCICA PIENA: bere ½-1 litro di acqua 45 minuti prima dell'esame.

  N.B.: la posologia del Milycon, il tipo di clistere e la quantità di acqua da bere variano in base all'età del paziente.

ADDOME INFERIORE + VIE URINARIE

- Assunzione di liquidi (circa 1 ora prima dell'esame) per bambini da 1 a 3 anni;
- vescica piena da 3/5 ore per bambini dai 3 anni in su.

ORGANI PELVICI (UTERO/OVAIE)

Bambine da 3 anni in su **:**
- Vescica piena da 3/5 ore
- 3 giorni prima dell'esame iniziare ad assumere 1-2 cpr di Mylicon ogni 8 ore (o in alternativa 3 gtt/kg di Milycon ogni 8 ore),
- Evitare dalle 24 ore prima di assumere cibi con verdure e grassi,
- digiuno da 6 ore prima dell'esame,
- tre ore prima dell'esame pulizia intestinale mediante clisterini o clistere in base all'età.